

Τα ενήλικα Culicoides δραστηριοποιούνται κυρίως βραδινές ώρες (από τη δύση του ηλίου και έπειτα) και τρέφονται από το αίμα των ευαίσθητων ειδών ζώων.

Τα ενήλικα Culicoides χρειάζονται νερό για την αναπαραγωγή τους. Για την ακρίβεια, το Culicoides imicola γεννά αβγά σε υγρό έδαφος ή λάσπη.

Δεν υπάρχει καμιά αποτελεσματική θεραπεία για τα άρρωστα ζώα.

Η καταπολέμηση των εντόμων- φορέων θεωρείται ουσιαστικά μεγάλης σημασίας για την εξάλειψη της νόσου.

Περιορισμοί στις μετακινήσεις των ζώων και καραντίνα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης σε ελεύθερες από ΚΠ περιοχές.

Οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να έχουν στενή επαφή με την Κτηνιατρική υπηρεσία, ώστε να μετακινούν ζώα από περιοχές που δεν υπάρχουν κρούσματα ΚΠ.

Μεγάλης σημασίας επίσης θεωρείται η διενέργεια απολυμάνσεων και απεντομών των χώρων διαμονής των ζώων, πάντα με την συνεργασία Κτηνιάτρων.